FAST TRACK EN CIRUGIA COLO-RECTAL

Definimos la rehabilitación multimodal o *Fast Track* como el conjunto de actuaciones peroperatorias encaminadas a acelerar la recuperación de los pacientes sometidos a cirugía (convencional o laparoscópica), sin incrementar la morbilidad de los cuidados tradicionales. Para ello se precisa la colaboración de todo el personal sanitario.

- **Criterios de Inclusión:**

- Cirugía electiva.
- ASA I-II-III.
- Edad comprendida entre 18-80 años.
- Voluntad de participar en Fast Track.
- Buen estado nutricional.

- **Criterios de Exclusión:**

- Cirugía de urgencias, absceso o perforación.
- ASA IV.
- Edad menor de 18 o mayor de 80 años.
- Negativa a participar en Fast Track.
- Enf. Crohn o desnutrición.
- Síndrome adherencial conocido.

A continuación se reseñan las actuaciones a seguir, salvo contraindicación facultativa:

CONSULTAS EXTERNAS

- 1.- Se informa al paciente de su patología y la operación que requiere.
- 2.- Se le da Consentimiento Informado para su lectura y firma. Se ingresa en Lista de Espera Quirúrgica.
- 3.- Se le facilita protocolo de Fast Track para su lectura y comprensión previo a la cirugía, incluyendo dieta sin residuos y Probióticos/Simbióticos (*Anexo 1*) que debe seguir 3 semanas antes de la intervención (desde ese mismo día en caso de patología neoplásica).
- 4.- Caso de precisar estoma (temporal o definitivo) se remitirá a Consulta de Estomaterapia para recibir educación estomal preoperatoria.

FECHA DE INTERVENCION **(Secretaría)**

- 1.- El paciente es avisado telefónicamente del día de la intervención, momento en el que se comprobará si ha seguido las recomendaciones o no, en cuyo caso se le comunicará al Facultativo responsable quien determinará actitud a seguir.

DIA PREVIO A LA **INTERVENCION** **(Planta de Cirugía)**

- 1.- Caso de no haber sido valorado previamente por Anestesia, el paciente acudirá el día antes de la intervención para obtener el visto bueno anestésico correspondiente.
- 2.- En el supuesto de precisar estoma, el paciente será visto en la Consulta de Estomaterapia para el marcaje del lugar idóneo para la realización del mismo.
- 3.- No se realizará de manera sistemática preparación mecánica del colon, salvo criterio facultativo.
- 4.- Se administrará enema de limpieza de 200 ml. esa noche y a la mañana siguiente.
- 5.- Se extraerá muestra para sangre en previsión (3 unidades).
- 6.- Se comprobará la Hoja de Pre-Anestesia por si existen indicaciones de última hora, tales como actualización de pruebas del preoperatorio u otras.
- 7.- Se administrará Heparina de bajo peso molecular para profilaxis antitrombótica a las 21:00, bien Bemiparina (*Hibor*[®]) 3.500 unids. ó Enoxaparina (*Clexane*[®]) 40 mgr. Sc. Se mantendrá 21 días.
- 8.- Se administrará la medicación habitual del paciente, a excepción de antiagregantes y anticoagulantes, que deben ser suspendidos con anterioridad, y la pre-medicación anestésica.

DIA PREVIO A LA INTERVENCION
(Planta de Cirugía)

- 9.- El paciente debe mantener una movilización activa en todo momento.
- 10.- Se facilitará dieta sin residuos, bebidas ricas en hidratos de carbono y probióticos hasta las 24 horas.
- 11.- Rasurado abdominal completo. Rasurado perineal a criterio facultativo.

DIA DE LA INTERVENCION
(Quirófano)

- 1.- Colocación preoperatoria de medias de compresión neumáticas en ambos mm.ii.
- 2.- Preparación del campo quirúrgico con Clorhexidina (salvo alergia) y profilaxis antibiótica con Amoxicilina-Clavulánico 2 gr. En caso de alergia, se administrará Metronidazol 500 mgr. + Gentamicina 80 mgr.
- 3.- Se retirará la SNG al finalizar la intervención y se infiltrarán las heridas con Bupivacaína (*Svedocain*[®]).

DIA DE LA INTERVENCION
(Planta de Cirugía)

- 1.- Iniciar la ingesta en la cena con agua gelificada, bebidas ricas en hidratos de carbono y nutricionales.
- 2.- Incorporar cabecero de la cama y estimular la movilización. Facilitar inspirómetro.

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
(Planta de Cirugía)

- 1.- Se reducirá a la mitad la fluidoterapia en el primer d.p.o., para retirar al día siguiente.
- 2.- Se retirará la sonda vesical al primer d.p.o. (la SNG si subiera con ella de quirófano) y el drenaje al 2º d.p.o.
- 3.- Se facilitará la medicación según prescripción médica y se levantará al menos 6 horas al sillón.
- 4.- Se facilitarán bebidas nutricionales y ricas en hidratos de carbono, así como dieta progresiva.

BIBLIOGRAFÍA:

- Perioperative strategy in colonic surgery; LAparoscopy and/or FAst track multimodal management versus standard care (LAFA trial). Wind J, Hofland J, Preckel B *et al.* BMC Surgery 2006, 6: 16.
- Multimodal Perioperative Rehabilitation in Elective Conventional Resection of Colonic Cancer: Results from the German Multicenter Quality Assurance Program 'Fast-Track Colon II'. Braumann C, Guenthera N, Wendling P *et al.* Dig Surg 2009; 26: 123–129.

Dr. J. Santoyo Santoyo

Director UGC Cirugía General, Digestiva y Trasplantes

Dr. S. Mera Velasco

Jefe de Unidad de Cirugía Colorrectal