



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE 2018-2019 PARA PROFESIONALES CON INICIO EL 22 DE OCTUBRE.

Le informamos que hemos comenzado la campaña de vacunación frente a la gripe estacional de la temporada 2018-2019 que se desarrollara preferentemente entre los meses de octubre a diciembre. La finalización de la campaña se comunicara en función del desarrollo de la misma. El preparado vacunal, recomendado por la OMS, esta compuesto por tres cepas virales, que son:

- cepa análoga a A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09
- cepa análoga a A/Singapore/INFIMH-16-019/2016 (H3N2)
- cepa análoga a B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87)

Con respecto a la vacuna utilizada en la temporada anterior, se ha producido el siguiente cambio en la composición de las vacunas para esta temporada 2018-2019:

- El componente A (H3N2) que anteriormente era cepa A/Hong Kong/4801/2014, se ha sustituido por A/Singapore/INFIMH-16-019/2016.
- El componente B recomendado en la vacuna trivalente, que anteriormente era B/Brisbane/60/2008, se ha sustituido por B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87).

Durante la campaña 2018-2019, se distribuirán las siguientes vacunas antigripales:

- **AFLURIA® (Seqirus Spain, S.L).** Vacuna trivalente de virus fraccionados, inactivados.

Cultivada en huevo. Su utilización esta limitada por ficha técnica a PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS en las que este recomendada la vacunación. **En esta**

Campaña se utilizará preferentemente para personas mayores de 13 años.



- **VAXIGRIP® (Sanofi Pasteur)** Vacuna trivalente de virus fraccionados, inactivados. Cultivada en huevo. Esta vacuna se administrara a todos los NIÑOS DE 6 MESES A 13 AÑOS DE EDAD (inclusive) en los que este recomendada la vacunación. Esta vacuna también se utilizara en las **MUJERES EMBARAZADAS preferentemente**.

La administración de estas vacunas se realizará mediante inyección intramuscular o subcutánea profunda.

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmunidad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.

La vacuna esta disponible desde el **lunes 22 de octubre**, en turno de mañana y de Lunes a Viernes en:

- a) Hospital General cuarta planta Pabellón A. (extensión 901545)
- b) Hospital Materno-Infantil planta tercera interalas central (extensión 902243), rogando al personal que acudan previa petición de cita.

Consideraciones de interés:

PRIMERO.- Es especialmente importante, como queda reflejado en distintos Organismos y Sociedades Científicas Internacionales, la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad, y la Consejera de Salud, que aquellas personas que “trabajen en contacto directo con enfermos ingresados o en Consultas Externas o en Hospitalización Domiciliaria, tengan especial **facilidad de acceso** a la aplicación de la Vacunación Antigripal Estacional, en el medio laboral hospitalario, para quedar protegidos, al tiempo que se evita posible infección (en caso de ser fuente) a pacientes vulnerables pertenecientes a grupos de riesgo por problemas clínicos crónicos”.

SEGUNDO.- La atención a pacientes con especiales características clínicas, que les hacen muy propensos, a tener complicaciones (a veces grave) si contrajesen enfermedad por alguno de los virus frente a los que la vacuna protegería, hace que recalquemos, con



especial énfasis, que esta Empresa pone la vacuna a disposición de **TODOS SUS TRABAJADORES** para que se protejan mediante la vacunación, consiguiendo con ello beneficio directo para el propio Trabajador e indirecto, pero muy importante, para la atención prestada a cierta población de pacientes en nuestros Centros asistidos durante los meses de actividad gripal (otoño-invierno 18-19).

TERCERO.- Los adultos requieren **UNA** sola dosis de la vacuna anteriormente citada.

CUARTO.- Las personas que recibieron la vacuna contra la gripe en campañas anteriores, deben también vacunarse en la que ahora comenzamos.

QUINTO.- Como ampliación informativa sobre los puntos anteriores, consideramos que deben prestar especial atención, aquellas personas empleadas en nuestro Hospital, incluidas en algunos de los **Grupos de mayor riesgo** y que resaltamos:

5.1. Trabajadores en “contacto mantenido en el tiempo, con pacientes susceptibles de complicar su curso clínico” en caso de infección gripal, (p.ej. trabajadores de Urgencias y Críticos, UCIs, Unidades Infecciosas, Neumología, Pediatría, Neonatología, Obstetricia-Ginecología, Cardiología, Oncología, Oncología Radioterápica, Quemados-Plástica, M. Interna, Maternidad, Nefrología, Unidad Diálisis, Endocrinología–Nutrición, Rehabilitación, Hospitales de Día, Unidades de Trasplantes, Facultativos de las Especialidades con guardia durante la temporada prevista, Enfermería y Aux. Enfermería de todas las Unidades Asistenciales, Enfermería de Enlace Interniveles, Servicios de Mantenimiento, y Celadores como más significativos).

5.2. Trabajadores con “patología de base”, pertenecientes a Grupos de Riesgo

5.3. Personal perteneciente a los “equipos de hospitalización a domicilio”.

5.4. Aquellos Trabajadores que por “circunstancias de su entorno familiar” pudieran transmitir la gripe, a sujetos de alto riesgo en su propio domicilio. Incluye también padres y convivientes y personal asistencial que cuiden a lactantes menores de 6 meses de edad, durante esta temporada otoño-invierno.

5.5. Trabajadoras embarazadas en cualquier trimestre de gestación.



SEXTO.- Las preocupaciones relacionadas con la inocuidad y la eficacia de la vacuna contra la Gripe Estacional, pueden quedar disipadas, pues le informamos que la vacuna se somete a una revisión por la Agencia Europea del Medicamento, para asegurar su inocuidad y su potencia antes de ser aprobada para aplicar a las personas. El personal sanitario encargado de la campaña de vacunación en nuestros centros hospitalarios le informará de las posibles contraindicaciones y efectos adversos que puedan presentarse. Los adultos sanos “no vacunados”, que contrajesen la Gripe esta temporada, pueden transmitir algunos de los virus gripales a otra persona, desde 1 día antes de comenzar sus síntomas, y pueden continuar infectando a otras personas, hasta 5 días después de enfermar.