RECOGIDA DE HECES

CULTIVO:

Recoger muestra de aquellas zonas donde haya sangre, moco o pus. No debe utilizarse para la recogida papel higiénico, se usará una cucharilla o depresor. No son válidas las heces mezcladas con orina o agua. Mantener refrigeradas hasta su envío.

HECES 24H:

Recoger todas las heces emitidas en este periodo. Pesar el envase antes de iniciar la recogida y anotarlo en un lateral. Desde el momento en que se inicia la recogida, ésta debe permanecer refrigerada hasta que vayan a ser entregadas.

PARÁSITOS:

Se seguirá el mismo procedimiento que la recogida de muestra para el cultivo de heces

OTRAS DETERMINACIONES:

Recoger una muestra del tamaño de una nuez si son pastosas. Si son líquidas coger entre 5 y 10ml. En un contenedor seco. Mantener refrigerqadas hasta su envío.

TIRA DE GRAHAN:

Lavar el ano antes de las 6 de la tarde del día anterior. No hacer ninguna deposición antes de recoger la muestra. A primera hora de la mañana se separan las nalgas con los dedos, para que los pliegues del ano (que es donde las lombrices depositan sus huevos durante la noche) queden extendidos. Sobre ellos se pega un adhesivo transparente, para que queden adheridos en él. Después este adhesivo se pega en un porta de cristal que se entregará en el laboratorio.

RECOGIDA DE SEMEN

CULTIVO:

Lavar las manos con agua y jabón. Retraer completamente el prepucio, y mantener así hasta que se haya recogido el semen. Limpiar el glande con jabón neutro. Eliminar los restos de jabón enjuagándolo con agua. La muestra se obtiene por masturbación en un recipiente estéril facilitado en el centro o adquirido en farmacia.

SEMINOGRAMA:

La muestra de semen se recoge por masturbación en un recipiente estéril facilitado en el centro o adquirido en farmacias. Es necesario que haya pasado un periodo de 3-5 días sin eyacular. Se recomiendan medidas de higiene personal igual que para el cultivo. La recogida de la muestra puede realizarse en una habitación que el hospital tiene habilitada para ello, o fuera del hospital, siempre que transcurra menos de 1 hora desde la eyaculación. Una vez recogida la muestra debe ser protegida de frío y calor intensos, y se entregará en laboratorio de Lunes a Viernes de 9,30 a 10,30h.

INFORMACIÓN PARA LA RECOGIDA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MUESTRAS

Horario: De 7.30 h a 14 h

Hospital regional Universitario Carlos Haya. Materno-Infantil

ARROYO DE LOS ANGELES S/N
MÁLAGA CP 29011

Unidad de Gestión de Laboratorio

Ed. II 2013

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

RECOGIDA DE ORINA DE 24H.

Esta prueba es válida solamente si el recipiente incluye toda la orina que se emite en un periodo exacto de 24h. Si por alguna razón no se pudiera recoger la totalidad de la orina, puede que la prueba no sea válida y tenga que repetirse.

El periodo de recogida comienza a partir de haber desechado la primera orina a las 8h de la mañana, ya que esta se ha formado antes de empezar el tiempo de recogida. A partir de este momento, se recoge toda la orina producida durante las 24h. Hasta la orina emitida a las 8h de la mañana siguiente incluída, ya que esta sí se formo dentro del plazo de recogida.
Desde el momento en que se inicia la toma de orina, y durante las 24h. esta debe permanecer refrigerada.

En caso de que el contenedor contenga ácido, porque la prueba solicitada lo precise, se deberá anotar en un lateral del recipiente. En este caso, no se debe orinar directamente dentro del recipiente, porque la salpicadura del ácido puede quemar la piel. Si la determinación solicitada es de Catecolaminas se deberá seguir una dieta durante los tres días anteriores a la recogida. Consulte a su médico.

Utilice solamente los contenedores facilitados por el personal sanitario

RECOGIDA DE ORINA PARA CULTIVO

TÉCNICA PARA MUJERES:

Lavar las manos con agua y jabón, secar con una toalla límpia. Separar los labios mayores y menores, y mantenerlos separados hasta que se haya recogido la orina.

Con una gasa enjabonada lavar bien la vulva, pasándola de delante hacia atrás. Enjuagar bien con agua para eliminar los restos de jabón. Desechar los 20-25 primeros ml. Tras lo cual, sin interrumpir la micción, recoger la orina media en el recipiente desechando la última parte.

El frasco debe sujetarse para que no tome contacto con las piernas, vulva o ropa de la paciente. Los dedos no deben tocar el borde del frasco o superficie interior

TÉCNICA PARA HOMBRES:

- Lavar las manos con agua y jabón.
- Retraer completamente el prepucio, y se mantendrá así en todo momento hasta que se haya recogido la orina.
- Limpiar el glande con jabón neutro.
- Eliminar los restos de jabón enjuagándolo con agua.
- Orinar desechando los primeros 20-25ml. y sin interrumpir la micción coger la orina media en el recipiente despreciando el resto.

TÉCNICA PARA NIÑOS

En niños/as mayores, la orina se recoge de forma similar a los adultos.
En niños/as que no controlan esfínteres, recoger la orina en colectores o bolsas estériles especialmente diseñadas para ello.
Lavar cuidadosamente los genitales y el área donde se colocará la bolsa o el colector. Vigilar la bolsa durante 30 minutos, y cuando orine retirarla lo antes posible e introducirla en un recipiente estéril para enviarla al laboratorio. Si la micción no se ha realizado en una hora, se repite la operación, colocando una nueva bolsa.

RECOGIDA DE ESPUTOS

Se enjuagará la boca con agua (no usar antiséticos orales). Si usa dentadura postiza, debe quitársela antes de obtener la muestra.
Obtener el esputo tras una espectoración profunda, preferentemente a primera hora de la mañana.
Recoger la muestra directamente dentro del contenedor facilitado y tapar bien.
El esputo debe ser consistente. Si la muestra es saliva no servirá.
Si le piden muestras de 2 o 3 días consecutivos, deberá anotar en el frasco el día de recogida. Se guardarán refrigeradas hasta el día de la última recogida. Se entregarán todas juntas.